



PAHINTULOT SA PAGGAMOT SA PSYCHIATRY

_____ (pangalan ng pasyente), ang inyong manggagamot _____ ay iminumungkahi na kayo any tumanggap ng (mga) sumusunod na gamot:

- Antipsychotic: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Antipsychotic: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Antidepressant: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Antidepressant: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Antianxiety: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Sleeping agent: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Mood stabilizer: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Stimulants: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Ibang gamot: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA
- Ibang gamot: _____ mg sa _____ (Ruta) _____ beses/araw hanggang sa _____ mg/araw. Hindi FDA

Kinakailangang ipaalam sa inyo ang inyong karapatang tumanggap o tumanggi sa gamot. Maliban dito, kinakailangan din na ipaalam sa inyo ang mga sumusunod na impormasyon tungkol sa bawat gamot:

- Ang kalagayan ng inyong karamdaman sa psychiatry, ang dahilan ng paggagamot, mga maaaring mangyari kung walang gamot, at kung anu-ano pa ang maaaring maging ibang paraan ng paggagamot, kung mayroon man.
- Pangalan at uri ng gamot, dalas ng paggamit, dosis (kabilang ang “kung kinakailangan lamang”), ruta (inom o iniksiyon), at kung gaano katagal ang paggagamot.
- Mga pangkaraniwang side effects, at mga maaaring mangyari sa inyong tanging kalagayan.
- Mga maaaring side effects kung kayo ay iinom ng gamot na mas matagal sa tatlong buwan; halimbawa, ang antipsychotic ay maaaring magdulot ng hindi normal na kilos ng katawan. Itong sintoma ng tardive dyskinesia ay maaaring maging permanente at maaaring magpatuloy kahit na itinigil na ang gamot.
- Maaari ninyong bawiin ang inyong pahintulot kahit kailan, ipaalam lamang sa miyembro ng namamahala sa inyong paggagamot.

Ang inyong lagda sa ibaba ay nagpapahiwatig na (1) kayo ay pumapayag sa mga itinutukoy sa itaas, (2) may sapat na impormasyon na tinalakay sa inyo ng inyong manggagamot, at (3), kayo ay pumapayag na tanggapin ang (mga) gamot.

Lagda: _____ (pasyente/legal na kinatawan) Petsa: _____ Oras: _____ AM/PM
(Signature) (Date) (Time) (AM/PM)

Kung nilagdaan ng taong maliban sa pasyente, isulat ang kaugnayan: _____
I-print ang pangalan: _____
(Print name)

Naiintindihan ng pasyente ang uri at epekto ng (mga) gamot at pumapayag na gamitin ito, ngunit hindi pumapayag na pumirma sa nakasulat na pahintulot. Lagda ng saksi: _____ Petsa: _____ Oras: _____ AM/PM
(Witness signature) (Date) (Time) (AM/PM)

Pahintulot na ibinigay sa pamamagitan ng interpreter: Pangalan ng interpreter at ID # _____

Ako ang nagbigay sa pasyente/kinatawan ng pasyente ng paliwanag tungkol sa paggagamot, mga maaaring panganib at pakinabang, ng paggamit ng gamot, at kung hind magpagamot, at iba pang mga paraan ng paggamot. Ang pasyente ay hinikayat na magtanong at ang lahat ng katanungan ay nasagot.

Lagda ng Manggagamot: _____ Petsa: _____
(Provider Signature) (Date)



PAHINTULOT SA PAGGAMOT SA PSYCHIATRY

SIDE EFFECTS

Ang anumang gamot ay maaaring magdulot ng di-hangad na epekto. Ang mga sumusunod ay listahan ng mga maaaring mangyari na side effects. Kapag may mangyari, ipaalam agad sa inyong manggagamot. Ang pangangati, pantal, pamamaga ng labi at/o dila at hirap sa paghinga ay maaaring palatandaan ng allergy. Kapag mangyari ang anuman sa mga ito, itigil kaagad ang (mga) gamot, tumungo sa pinakamalapit na emergency room, at ipaalam sa inyong manggagamot. Kung walang ganitong side effects, huwag itigil o baguhin ang dose ng gamot nang hindi muna nakikipag-usap sa inyong manggagamot. Ang paggawa nito ay maaaring makapinsala o maging sanhi ng sintomas ng biglaang pagtigil ng pag-inom ng gamot (withdrawal). Kumunsulta sa inyong maggagamot bago gumamit ng over-the-counter na gamot at mga herbal o tinatawag na "natural" na paggagamot dahil ang mga ito ay maaaring makaapekto sa isa't-isa. Ang mga gamot ay maaaring magdulot ng pagkaantok, kawalan ng koordinasyon ng kalamnan, (muscle coordination), kombulsiyon, na maaring makapinsala sa iyong kakayahan na magmaneho o magpatakbo ng mabigat na makinarya, or magsagawa ng maselang trabaho. Iwasan ang alcohol at droga dahil maaring madagdagan ang mga side effects ng gamot. Ipaalam sa inyong manggagamot kung ikaw ay nagdadalantao o may planong magdalantao o nagpapasuso (breastfeeding), dahil ang (mga) gamot ay maaaring magdulot ng panganib sa gayong kalagayan.

Babala sa Iitim na Kahon para sa malubhang pantal (Lamotrigine at Carbamazepine): Kung mangyari ang mga problema katulad ng pangangati, pantal, lagnat, pamamaga ng lymph glands, masakit na sugat sa loob ng bibig at sa paligid ng mata, o pamamaga ng labi o dila, ipaalam kaagad sa inyong manggagamot.

Antipsychotics Maaaring side effects: pagkaantok, tuyong bibig, hirap sa pagdumi, pagkahilo o pagkawala ng malay, pagkabalisa o panginig, pantal, pagtaas or pagbaba ng timbang, hindi regular na regla, pagtaas ng asukal at cholesterol at triglycerides sa dugo.

Madalang na side effects: hirap sa paglunok, mababang bilang ng cells sa dugo, kombulsiyon abnormal na kilos.

Antidepressants Maaaring side effects: pagkaantok, pagsusuka, pagduduwal, pagtatae, sakit ng ulo, nerbiyos, panginig, pagpapawis, hirap sa pagtulog, problema sa sex at sa gana sa pagkain.

Madalang na side effects: abnormal na pasa o pagdurugo, kombulsiyon

Babala sa Iitim na Kahon: mas mataas na panganib na mag-isip na magpakamatay sa mga pasyente hanggang sa edad na 24.

Antianxiety and Sleep Agents Maaaring side effects: pagkaantok, pagkahilo, pagduduwal, panghihina, pagkalito, sakit ng ulo, addiction, kahirapan sa konsentrasyon.

Madalang na side effects: Pagkalimot, hallucination, hindi pangkaraniwang problema sa pagtulog, (nagmamaneho o naglalakad habang tulog)

Mood Stabilizers Maaaring side effects: pagkaantok, pagkahilo, panunuyo ng bibig, pagtatae, pagbaba/pagtaas ng timbang, pananakit ng ulo

Madalang na side effects: paglabo /pagdodoble ng paningin, hirap sa pagdumi, pagkalito, bawas sa gana sa pagkain, abnormal na pasa o pagdurugo, mababang bilang ng cells sa dugo, problema sa bato /atay, paglalason (Lithium)

Stimulants Maaaring side effects: sa gana sa pagkain at sa timbang, nerbiyos, hirap sa pagtulog, pagtaas ng bilis ng puso/presyon ng dugo, pagkahilo

Madalang na side effects: pagkibot ng muscle, malubhang problema sa puso, lumalalang sintomas sa psychiatry